

ІНСТРУКЦІЯ

для застосування Ревайвал® Плюс Revival® Plus

Склад: 1 тверда желатинова шлунково-розчинна капсула синьо-синього кольору вагою 400,13 мг в блістері містить:

- вітамін В3 (ніацин) – 16 мг (mg);
- вітамін В6 (піридоксин) – 1,7 мг (mg);
- вітамін В7 (біотин) – 0,03 мг (mg);
- кобамамід – 2,4 мг (mg) (що еквівалентно вітаміну В12 3,0 мкг (μg));
- коензим Q₁₀ (убіхінон) – 30 мг (mg);
- L-карнітин – 120 мг (mg);
- цитрат магнію – 130 мг (mg);
- лізину гідрохлорид – 100 мг (mg).

1 тверда желатинова кишково-розчинна капсула біло-білого кольору вагою 400 мг в блістері містить:

- вітамін В1 (тіамін) – 1,3 мг (mg);
- вітамін В2 (рибофлавін) – 1,3 мг (mg);
- вітамін В5 (пантотенова кислота) – 5 мг (mg);
- вітамін В8 (інозитол) – 120 мг (mg);
- вітамін В9 (фолієва кислота) – 0,4 мг (mg);
- вітамін В14 (пірролохінолінхінон) – 10 мг (mg);
- альфа-ліпоева кислота – 50 мг (mg);
- D-рибоза – 212 мг (mg).

Загальна характеристика

Ревайвал Плюс - комплексний засіб метаболічної, цитопротекторної та ноотропної дії, для застосування в якості джерела біологічно активних сполук. Засіб характеризується безпечністю споживання та багатовекторним впливом на метаболічні процеси в організмі. Двократний прийом Ревайвал Плюс протягом доби обумовлений розподілом рівнів засвоєння діючих компонентів з наступним поділом на 2 функціональні капсули різного виду та кольору.

Дія компонентів

Вітаміни групи В є сукупністю незамінних водорозчинних сполук, які мають ключове значення для вуглеводного обміну, приймають участь у тканинному диханні та виробленні енергії. **Тіамін (В1)** виконує функцію коферменту в процесах декарбоксилювання α-кетокислот пентозофосфатного циклу та: потенціює утворення нейромедіаторів (ацетилхолін т.і.); підсилює роботу центральної і периферійної нервової систем (підтримка енергозабезпечення нейронів сприяє короткотривалій пам'яті, нормалізації сну, апетиту, підвищенню витривалості та продуктивності, координації рухів). **Рибофлавін (В2)** приймає участь у: окисленні жирних та трикарбонових кислот; інактивації та окисненні альдегідів і кетонів; синтезі коферментних форм вітаміну В6 і фолацина; підтриманні рівня глутатіону (метаболізм білків) та гемоглобіну. **Ніацин (В3)** у складі нікотинамід залежних ферментів (коензими кодегідрогенази I і II (НАД+ і НАДФ+)) виступає акцептором та переносником

атомів водню на початкових стадіях окиснення вуглеводнів, пуринів, жирних та амінокислот, гліцерину. Приймає активну участь у: термінальних стадіях електрон-транспортного (ЕТЛ) та монооксигеназного ланцюгів мітохондрій; реакціях циклу Кребса; ліквідації дефіциту вітамінів при запальному ураженні шкіри та вікових когнітивних розладах. **Пантотенова кислота (В5)** стимулює синтез глюкокортикоїдів, сприяє метаболізму вітамінів, бере участь в синтезі нейромедіаторів. **Піридоксин (В6)** - коензим багатьох ферментів, який підтримує: метаболізм амінокислот; регуляцію синтезу ліпідів та протеїнів; сприяє гліколізу та енергетичному обміну в клітині; накопиченню нейромедіаторів (гліцин, ГАМК, серотонін т.і.); регуляції збудливості ЦНС; збільшенню внутрішньоклітинного накопичення магнію. **Інозитол (В8)** сприяє підтримці нейрональної функції (синаптична передача) та енергетичного метаболізму в ЦНС. **Фолієва кислота (В9)** - кофермент ензимів, які сприяють поділу клітин та регенерації тканин. **Кобамамід (В12)** сприяє обміну вуглеводнів, білків і ліпідів у клітині, підтримує процеси кровотворення та визрівання еритроцитів. **Пірролохінолінхінон (В14)** сприяє нейтралізації та виведенню вільних радикалів (оксиду заліза, нітритів т.і.), супероксид-/гідроксил радикалів, біогенезу мітохондрій у клітині.

Альфа-ліпоева кислота кофермент мітохондріальних мультиензимних комплексів, який бере участь в окисному декарбоксилюванні піровиноградної (в т.ч. при накопиченні в міжклітинному просторі судин та нервових волокон) і альфа-кетокислот (детоксикація азотовмісних сполук в клітинах мозку) у циклі Кребса, посилює дію карнітину та піридоксину.

Магній (цитрат магнію) кофермент в: гліколізі та циклі трикарбонових кислот; при виробленні АТФ у мітохондріях; при роботі Na⁺/K⁺-наосу клітинних мембран. Додатковим механізмом магнію являється зниження збудження нейронів і нейром'язової передачі.

Коензим Q10 бензохіноновий коензим, який входить до складу ЕТЛ, приймає участь у окисному фосфорилюванні, забезпечує синтез молекул АТФ мітохондріями, проявляє прямі антиоксидантні властивості.

D-рибоза структурний компонент синтезу нуклеїнових кислот та АТФ, стимулює процеси гомеостазу, нормалізує енергетичні потреби в клітинах за умов психофізичних навантажень та патологічних станів.

Виробник.

ТОВ «Фармацевтична компанія «Елемент здоров'я»
Україна, 03062, м. Київ, вул. Естонська, буд. 120

тел. (044) 364-86-03

healthelement.com.ua



L-карнітин - вітаміноподібна сполука, яка сприяє транспорту та β-окисненню довголанцюгових жирних кислот в мітохондріях, підтримує рівень кофериенту А (КоА), приймає участь в метаболізмі амінокислот, елімінації ксенобіотиків та органічних речовин (детоксикаційна дія).

Лізину гідрохлорид - незамінна амінокислота, яка: входить до структурних протеїнів (колаген, еластин); забезпечує гуморальну відповідь В-лімфоцитів; забезпечує антагонізм серотонінових рецепторів (анксіолітична дія) та синтез L-карнітину.

Рекомендації до споживання:

дієтична добавка до раціону харчування - джерело вітамінів групи В, коферментів, амінокислот, вуглеводнів та макроелементів, сприяє загальному зміцненню організму, нормалізації функціонування нервової системи, позитивно впливає на стан серцево-судинної системи, підвищує енергетичний баланс клітин, покращує обмін речовин, підвищує стійкість організму до фізичної та психічної перевтоми. Має помірні антиатеросклеротичні, антиоксидантні та детоксикаційні властивості.

Можливе застосування дієтичної добавки Ревайвал Плюс, як додаткове джерело вітамінів групи В, коферментів, амінокислот, вуглеводнів та макроелементів при недостатньому рівні їх споживання у разі підвищеної потреби організму в цих мікроелементах в комплексі з терапією при: запальних та посттравматичних ускладнень головного мозку (перенесені ішемічний інсульт чи черепно-мозкова травма, деменція); виснаження та запальних процесів нервової системи (астенія, нейропатія, отруєння нейротоксинами т.і.); серцевій та респіраторній недостатності (ІХС, перенесений ІМ, метаболічні порушення структури міокарда та легень, клімактерична кардіоміопатія); розладів ендокринної системи (ЦД2, захворювання щитоподібної залози, метаболічні розлади); наслідків запальних захворювань стінки судин (ангіопатія); ураженнях гепато-біліарної системи (гепатоз, алкогольна інтоксикація т.і.); запальних / чи наслідків інфекційних процесів слизової оболонки та шкірних покривів (мукозит, дерматоз т.і.)

Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Спосіб вживання:

дорослим та дітям віком від 15 років по одній синьо-синій або синьо-білій капсулі зранку та одній біло-білій капсулі в обід після вживання їжі, запиваючи достатньою кількістю води.

Термін вживання:

від 3-х тижнів до 3-х місяців, в подальшому термін та можливість повторного курсу споживання узгоджувати з лікарем індивідуально. Не перевищувати зазначену рекоменда-

вану кількість для щоденного споживання.

Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.

Протипоказання.

Гіперчутливість до окремих компонентів препарату, злаякісні новоутворення, пептична виразка шлунку або дванадцятипалої кишки в активній фазі. При недотриманні вказаних рекомендацій щодо споживання та дозування можливе виникнення тахікардії, диспепсичних розладів, збудження, підвищення або зниження артеріального тиску.

Застереження.

Вживання дієтичної добавки жінкам в період вагітності і лактації, дітям до 15 років за рекомендаціями та під наглядом лікаря.

Не є лікарським засобом. Без ГМО.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.

Форма випуску:

Груповая картонна упаковка містить 2, 4, 6 або 8 блістерів по 10 капсул в кожному блістері:

- 1) 1 блістер з твердими желатиновими шлунково-розчинними капсулами синьо-синього або синьо-білого кольору масою нетто кожна капсула по 400,13 мг;
- 2) 1 блістер з твердими желатиновими кишково-розчинними капсулами біло-білого кольору масою нетто кожна капсула по 400 мг.

Фасування можливе по 1, 2, 3, 4 кожного з двох типів блістерів в груповій картонній упаковці; фасування згідно ТУ У 10.8-33558748-005:2017 «Добавки дієтичні «Ревайвал Плюс», «Трилумін» та «Айлів».

Тверді желатинові капсули №1 або №2 з корпусом білого та синього кольору, з кришкою білого і синього кольору. Вміст капсул – порошок від білувато-жовтого до світло-оранжевого кольору з темними та/або білими вкрапленнями згідно характерної використаної сировини.

Умови зберігання: в оригінальній упаковці виробника, у сухому захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі від 2°C до 25°C.

Строк придатності: 24 місяці від дати виробництва. Не слід застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

Виробник: ТОВ “Фармацевтична компанія Елемент здоров’я”, Україна, 03062, м. Київ, вул. Естонська, буд. 120.
ТУ У 10.8-33558748-005:2017

Дата виробництва або кінцевий термін придатності, номер серії приведені на упаковці.

Виробник.

ТОВ «Фармацевтична компанія «Елемент здоров’я»
Україна, 03062, м. Київ, вул. Естонська, буд. 120

тел. (044) 364-86-03

healthelement.com.ua